CURALANCHA®

INTEROC CUSTER

ACCIÓN FITOSANITARIA: CURALANCHA es un Fungicida preventivo y curativo, con acción protectante y sistémica para el control de la Lancha y el Tizón temprano en los cultivos de papa y tomate.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: CURALANCHA es formulado como polvo mojable. Contiene:
Cimoxanil 8 % + Mancozeb 64 %.

NOMBRE COMÚN: Cimoxanil + Mancozeb.

COMPATIBILIDAD: Compatible con los plaguicidas comúnmente usados como Benomil, Carbendazim y Mancozeb; sin embargo, si el producto con que se mezcle eleva el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al Cimoxanil sufre degradación.
En caso de desconocer la compatibilidad, es necesario hacer una prueba a pequeña escala.

MODO DE EMPLEO: CURALANCHA es un fungicida con acción preventiva y curativa al detener el desarrollo del hongo durante su incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.
Es un fungicida para ser mezclado con agua y aplicado en forma de aspersión foliar para el control de la lancha y el tizón temprano en los cultivos de papa y tomate.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad recomendada de producto en un balde y luego deposítelo en el tanque de la mezcla que contega agua hasta ¼ o la mitad de su capacidad; complete el volumen de agua hasta que la mezcla sea homogénea.
Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

FITOTOXICIDAD: CURALANCHA usado en las dosis recomendadas y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta ha mostrado alta seguridad sobre los cultivos de papa y tomate, no produciendo síntomas de fitotoxicidad.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.

PRESENTACIONES:
Funda x 250 g.
Funda x 500 g.

REGISTRO MAGAP: 058-F12/NA.

FABRICADO POR: INTEROC CUSTER CPG HOLDING.

DISTRIBUIDO POR: INTEROC S.A.

RECOMENDACIONES DE USO DE CURALANCHA:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA
	NOMBRE COMÚN	AGENTE CAUSAL			
PAPA *Solanum tuberosum*	Lancha	*(Phytophthora infestans)*	2 kg/ha o 500 g/200 litros de agua o 50 g/bomba de 20 litros.	Cada 7 a 14 días, repitiendo las aplicaciones según la presencia de la enfermedad.	No hay restricción.
TOMATE *Lycopersicum esculentum*	Lancha Tizón temprano	*(Phytophthora infestans)* *(Alternaria solani)*			